

燒傷的護理 (Burn Care)

請小心按照以下指示：

- 保持紗布，繃帶清潔乾爽。
- 每天更換紗布，繃帶和用溫和的肥皂和暖水清洗傷口兩次。清洗傷口可除去髒的死皮。
- 更換紗布時，可按醫生指示，在傷口上塗上一層薄的抗生素藥膏。
- 如燒傷手臂或腿之後的24小時內，要把手臂或腿墊起至高於心臟的位置，可幫助和減少腫和痛。
- 除非醫生規定服用的止痛藥，傷者可服用 TYLENOL，ADVIL，MOTRIN或ASPIRIN止痛。
- 燒傷後的24小時內，傷者要飲用充分的液體。
- 盡可能不要弄破水泡。如果水泡破了，要用乾淨的鉗子和剪刀輕輕的把死皮剪掉。
- 回醫院復診，讓醫生檢查您剛痊癒的傷口。

如有以下的病情發生，請馬上返回急症室或是見您的私家醫生：

- 傷口疼痛，紅和腫增加。
- 傷口的紅色線條消失。
- 有腐壞的氣味和有黃色或綠色的濃液體流出。
- 發燒或發冷。
- 任何使您覺得擔憂焦慮的問題。

急症室每天24小時服務。